

AGER-BI

Fitoregolatore ad azione di contatto per il controllo selettivo dei germogli ascellari primari e secondari del tabacco
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

Meccanismo di azione: HRAC Z

AGER-Bi

Composizione:

Acido pelargonico puro g. 78,4 (=718 g/l)

Coformulanti q.b. a g. 100

Contiene PEG-10 PEG-5 cetil fosfato (*Cetyl alcohol phosphate, ethoxylated, propoxylated*) e Acido fosforico

INDICAZIONI DI PERICOLO

H315 - Provoca irritazione cutanea. **H318** - Provoca gravi lesioni oculari.

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. **P273** - Non disperdere nell'ambiente. **P280** - Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi. **P310** - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P302+P352** - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P305+P351+P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P332 + P313** - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. **P337 + P313** - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. **P362 + P364** - Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. **P501** - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

AGER-Bi Registrazione del Ministero della Salute n. 17872 del 10/06/2021



Via G. Fauser 8, 28100 Novara (NO) - Italia - Tel.:0321 699611

Stabilimenti di produzione: DIACHEM S.p.A. - Via Mozzanica, 9/11 - 24043 Caravaggio (BG)-Italia

Contenuto netto: 5-10-20-60-1000(*) L

Partita n°



PERICOLO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Dopo l'applicazione non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare guanti e protezione oculare/facciale quando si maneggia il prodotto concentrato, quando si applica il prodotto e durante la fase di pulizia e manutenzione delle attrezzature. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.

Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto non trattata di 20 metri dai corpi acquatici superficiali.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE

AGER-Bi agisce per contatto e ha lo scopo di eliminare i germogli ascellari primari e secondari del tabacco già presenti al momento del trattamento. Per essere completamente efficace, la soluzione preparata deve bagnare i germogli ascellari delle piante. Il liquido irrorato deve scorrere lungo lo stelo delle piante e venire a contatto con le gemme ascellari.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Periodo di applicazione: AGER-Bi può essere impiegato in pre-cimatura ed in post-cimatura del tabacco.

- In pre-cimatura:** trattare con AGER-Bi a 1-4 giorni dall'operazione di cimatura (asportare se possibile nell'operazione di cimatura anche i germogli ascellari più lunghi di 2,5-3 cm).
- In post-cimatura:** intervenire preferibilmente in presenza di germogli di lunghezza non superiore ai 2 cm.

L'intervallo minimo che intercorre fra un trattamento e l'altro è di 7-10 giorni.

DOSI D'IMPIEGO

AGER-Bi si impiega alla concentrazione dell'1-1,2% (vol/vol), per un massimo di 5 applicazioni/anno utilizzando un volume d'acqua compreso fra i 400-600 l/ha. I valori nella tabella che segue sono indicativi. Adattare la concentrazione e il volume della soluzione in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell'attrezzatura impiegata senza superare i dosaggi massimi indicati.

-Dose massima per applicazione: 7,2 l/ha

-Dose massima di applicazione/anno: 36 l/ha

AGER-Bi Controllo dei germogli ascellari primari e secondari del TABACCO	Volume soluzione applicata (l/ha)			
	400	450	500	600
Dose di prodotto AGER-BI (l/ha) 1,0%	4,0 l/ha	4,5 l/ha	5,0 l/ha	6,0 l/ha
Dose di prodotto AGER-BI (l/ha) 1,2%	4,8 l/ha	5,4 l/ha	6,0 l/ha	7,2 l/ha

(*) ATTENZIONE: per la sola taglia da 1000 litri: lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

METODI DI APPLICAZIONE

Il trattamento con **AGER-Bi** deve essere eseguito con mezzi meccanici (barre irroratrici semoventi scavallanti) o con pompa manuale a spalla. Devono essere impiegati ugelli a cono pieno, mantenuti sopra le piante ad un'altezza tale da fare liberamente scorrere la miscela lungo lo stelo ed evitando di bagnare ove possibile, le lamine fogliari. Un'accurata taratura della macchina è essenziale affinché le condizioni d'applicazione siano rigorosamente osservate per un'adeguata applicazione del prodotto alla coltura. Gli ugelli, in gruppo di tre per fila di piante, devono essere disposti a 20 cm di distanza uno dall'altro, rivolti verso il basso: quello centrale verticale ed allineato con la fila delle piante, i laterali inclinati in direzione della cima delle piante. La barra irrorante deve essere mantenuta ad un'altezza tale da assicurare agli ugelli una distanza di 20-30 cm dalla sommità delle piante. La pressione alla barra deve essere di 1-1,2 bar.; si prescrive pertanto l'impiego di un manometro sensibile avente 3 atm come fondo scala.

AVVERTENZE

- Evitare che la miscela vada a contatto con le lamine fogliari, sensibili e pertanto soggette a possibile fitotossicità;
- Si sconsiglia di trattare in giornate ventose e su piante inclinate che vanno anticipatamente raddrizzate;
- Applicare la miscela nelle ore centrali della giornata, salvo in giornata particolarmente calde con temperature al di sopra dei 38°C;
- Intervenire su vegetazione asciutta;
- Il prodotto agisce entro 2-3 ore dall'applicazione. Non trattare in caso di pioggia o in caso di previsione di pioggia nelle 12 ore successive al trattamento;
- Non trattare piante ammalate, malnutrite e comunque sofferenti;
- Agitare il prodotto prima dell'uso nel suo contenitore;
- Preparare la miscela subito prima dell'impiego e mantenerla agitata nel serbatoio dell'irroratore;
- Non superare le dosi consigliate.

COMPATIBILITÀ

AGER-Bi va impiegato da solo.

ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

(*) **ATTENZIONE:** per la sola taglia da **1000 litri**: lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto