


# ALBENE

INSETTICIDA A BASE DI OLIO DI PARAFFINA  
(EMULSIONE OLIO IN ACQUA)

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>COMPOSIZIONE</b><br>100 g di prodotto contengono:<br><b>Olio di paraffina</b> (CAS n° 8042-47-5) g 78,1 (= 654 g/l)<br><b>Coformulanti</b> q.b. a g 100 |  | <b>SCAM S.p.A.</b><br>Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena, Italia<br>Tel. +39 059586511 |
| <b>Stabilimento di produzione:</b><br>SCAM S.p.A.  |   | L 0,25/0,5/1/5/10/20/25/50/100/200*/1000*   |
| Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena, Italia  |   |   |
| <b>Reg. n. 0206 del 20/11/1971 del Ministero della Salute</b>  | <b>Partita n.</b>   |   |

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
**PREVENZIONE:** P260 – Non respirare l'aerosol. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P271 – Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P273 – Non disperdere nell'ambiente.  
**REAZIONE:** ---  
**CONSERVAZIONE:** P401 – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
**SMALTIMENTO:** P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 16 m per pomacee e drupacee, di 18 m per agrumi e di 10 m per vite e piante ornamentali.

#### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

#### CARATTERISTICHE

ALBENE è un olio di paraffina ad elevato grado di insulfonabilità che agisce per asfissia contro tutte le forme svernanti degli insetti.

#### MODALITA' DI IMPIEGO

**Pomacee:** contro le Cocciniglie (*Q. Perniciosus*, *E. leperii*, ecc.), Afidi (*A. pomi*, *D. plantaginea*, *D. pyri*, ecc.), Acari (*P. ulmi*) 0,75-1,0 l/hl (10,0 L/ha impiegando volumi di acqua di 800-1000 L/ha) nei trattamenti di fine inverno-inizio primavera fino alla pre-fioritura, normalmente in corrispondenza della fase fenologica delle orecchiette di topo del melo e dei "mazzetti affioranti" per il pero. Effettuare 1 trattamento/anno

**Drupacee:** contro le Cocciniglie (*P. pentagona*, *Q. perniciosus*, *E. corni*, ecc.), Afidi (*Myzus spp.*, *H. amygdali*, *Brachycaudus spp.*, ecc.), Ragnetto rosso (*P. ulmi*) 0,75-1,0 L/hl (10,0 L/ha distribuiti con un volume di 800-1000 L/ha di acqua) nei trattamenti di fine inverno, normalmente dalla fase fenologica di "gemma rigonfia" a "bottoni rosa". Effettuare 1 trattamento/anno

**Agrumi:** contro le Cocciniglie (*C. hesperidium*, *S. oleae*, *P. pergandei*, *A. aurantii*, *I. purchasi*, *Ceratoplastes spp.*, ecc.) e la mosca bianca (*Dialeurodes citri*, *Aleurothrix floccosa*, ecc.) 1,0-1,5 L/hl (20-45 L/ha impiegando volumi di acqua di 2000-3000 L/ha) nei trattamenti invernali e primaverili-estivi fino all'ingrossamento dei frutti. Effettuare massimo 2 interventi/anno con un intervallo di almeno 14 giorni.

**Vite:** contro le Cocciniglie (*T. vitis*, *P. vitis*, ecc.), Ragnetto rosso (*P. ulmi*), Ragnetto giallo (*E. carpini*), Afidi 1,0 L/hl (5,0-12 L/ha distribuendo un volume di 500-1200 L/ha di acqua) nei trattamenti di fine inverno-inizio primavera (fino all'ingrossamento delle gemme). Effettuare 1 trattamento/anno

**Piante Ornamentali:** contro le Cocciniglie (*P. pentagona*, ecc.) e il Ragnetto rosso (*T. urticae*, *P. ulmi*), Afidi 1,0-2,0 L/hl (4,0-40,0 L/ha impiegando volumi di acqua di 400-2000 L/ha) nei trattamenti invernali e alla ripresa vegetativa. Effettuare massimo 2 trattamenti/anno.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA:** In caso di formazione di sedimento, agitare bene prima dell'uso.

#### FITOTOSSICITA'

Impiegare ALBENE con un intervallo di almeno 20 giorni dopo aver effettuato trattamenti con poltiglia bordolese, polisolfuri e prodotti contenenti captano, zolfo, tiram. Su piante ornamentali, data la notevole varietà di specie presenti, si consiglia di effettuare saggi preliminari prima di trattare l'intera superficie.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI;

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO


IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

\* Relativamente alla conf. 200-1000 lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

# ALBENE PFnPE

INSETTICIDA A BASE DI OLIO DI PARAFFINA  
(EMULSIONE OLIO IN ACQUA)

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>COMPOSIZIONE</b><br>100 g di prodotto contengono:<br>Olio di paraffina (CAS n° 8042-47-5) g 78,1 (= 654 g/l)<br>Coformulanti q.b. a g 100 |  | SCAM S.p.A.<br>Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena, Italia<br>Tel. +39 059586511 |
| Stabilimento di produzione:<br>SCAM S.p.A.   |   | L 0,25/0,5   |
| Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena, Italia  |   |  |
| Reg. n. 0206 del 20/11/1971 del Ministero della Salute   | Partita n.  |  |

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
**PREVENZIONE:** P260 – Non respirare l'aerosol. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P271 – Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P273 – Non disperdere nell'ambiente.  
**REAZIONE:** ---  
**CONSERVAZIONE:** P401 – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.  
**SMALTIMENTO:** P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.  
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 16 m per pomacee e drupacee, di 18 m per agrumi e di 10 m per vite e piante ornamentali.

## INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

## CARATTERISTICHE

ALBENE è un olio di paraffina ad elevato grado di insulfonabilità che agisce per asfissia contro tutte le forme svernanti degli insetti.

## MODALITA' DI IMPIEGO

**Pomacee:** contro le Cocciniglie (*Q. Perniciosus*, *E. leperii*, ecc.), Afidi (*A. pomi*, *D. plantaginea*, *D. pyri*, ecc.), Acari (*P. ulmi*) 0,75-1,0 l/hl (10,0 L/ha impiegando volumi di acqua di 800-1000 L/ha) nei trattamenti di fine inverno-inizio primavera fino alla pre-fioritura, normalmente in corrispondenza della fase fenologica delle orecchiette di topo del melo e dei "mazzetti affioranti" per il pero. Effettuare 1 trattamento/anno

**Drupacee:** contro le Cocciniglie (*P. pentagona*, *Q. perniciosus*, *E. corni*, ecc.), Afidi (*Myzus spp.*, *H. amygdali*, *Brachycaudus spp.*, ecc.), Ragnetto rosso (*P. ulmi*) 0,75-1,0 L/hl (10,0 L/ha distribuiti con un volume di 800-1000 L/ha di acqua) nei trattamenti di fine inverno, normalmente dalla fase fenologica di "gemma rigonfia" a "bottoni rosa". Effettuare 1 trattamento/anno

**Agrumi:** contro le Cocciniglie (*C. hesperidium*, *S. oleae*, *P. pergandei*, *A. aurantii*, *I. purchasi*, *Ceratoplastes spp.*, ecc.) e la mosca bianca (*Dialeurodes citri*, *Aleurothrix floccosa*, ecc.) 1,0-1,5 L/hl (20-45 L/ha impiegando volumi di acqua di 2000-3000 L/ha) nei trattamenti invernali e primaverili-estivi fino all'ingrossamento dei frutti. Effettuare massimo 2 interventi/anno con un intervallo di almeno 14 giorni.

**Vite:** contro le Cocciniglie (*T. vitis*, *P. vitis*, ecc.), Ragnetto rosso (*P. ulmi*), Ragnetto giallo (*E. carpini*), Afidi 1,0 L/hl (5,0-12 L/ha distribuendo un volume di 500-1200 L/ha di acqua) nei trattamenti di fine inverno-inizio primavera (fino all'ingrossamento delle gemme). Effettuare 1 trattamento/anno

**Piante Ornamentali:** contro le Cocciniglie (*P. pentagona*, ecc.) e il Ragnetto rosso (*T. urticae*, *P. ulmi*), Afidi 1,0-2,0 L/hl (4,0-40,0 L/ha impiegando volumi di acqua di 400-2000 L/ha) nei trattamenti invernali e alla ripresa vegetativa. Effettuare massimo 2 trattamenti/anno.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA:** In caso di formazione di sedimento, agitare bene prima dell'uso.

## FITOTOSSICITA'

Impiegare ALBENE con un intervallo di almeno 20 giorni dopo aver effettuato trattamenti con poltiglia bordolese, polisolfuri e prodotti contenenti captano, zolfo, tiram. Su piante ornamentali, data la notevole varietà di specie presenti, si consiglia di effettuare saggi preliminari prima di trattare l'intera superficie.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI;

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.