

NEMGUARD® SC

Sospensione concentrata (SC)

NEMATOCIDA A BASE DI ESTRATTO D'AGLIO PER SOLANACEE E CUCURBITACEE

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Estratto d'aglio (purezza 1000 g/kg) g 100,00 (= 1285 g/L)



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P261: Evitare di respirare i vapori.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P362+P364: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035-335313

Officina di produzione e confezionamento:

ECOSpray Ltd. - 6c Park Farm Business Centre, Fornham St. Genevieve, Bury St. Edmunds, Suffolk, IP28 6TS, Gran Bretagna

Officina di confezionamento:

I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Kollant S.r.l. - via C. Colombo, 7/7a - 30030 Vigonovo (VE)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 16742 del 11/07/2017

Contenuto netto: 0.5 - 1 - 5 - 10 - 20 litri.

Lotto n. del

Il prodotto è stabile per 2 anni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Conservare il recipiente ben chiuso.

Durante la normale manipolazione si sviluppa un forte odore di aglio, il quale può causare effetti di lacrimazione. Se dovesse accadere, portare il paziente all'aria fresca e, se necessario, lavare gli occhi con acqua. Se i sintomi persistono consultare un medico.

Informazioni per il medico: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE

Applicare NEMguard® SC al suolo di coltivazione mediante opportuno impianto di irrigazione, utilizzando volumi di acqua per ciclo di irrigazione compresi tra 1000-30000 L/ha. Le migliori condizioni per l'utilizzo del prodotto fitosanitario si ottengono quando il suolo è abbastanza umido. Si raccomanda quindi di aggiungere il prodotto all'acqua di irrigazione verso la fine del ciclo di irrigazione.

CARATTERISTICHE

NEMguard® SC è un nematocida a base di estratto d'aglio che agisce contro le forme libere (cioè gli stadi di sviluppo presenti nel terreno e non all'interno dei tessuti delle piante) di nematodi galligeni e liberi appartenenti ai generi *Meloidogyne*, *Tylenchus*, *Trichodorus*, *Longidorus*, *Pratylenchus*, *Xiphinema*, *Globodera*, *Heterodera*.

MODALITA' D'AZIONE

Coltura	Avversità	Dose	Volume di bagnatura	Numero di applicazioni/anno	Intervallo tra i trattamenti	Intervallo di sicurezza
Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana) Campo e serra	Nematodi galligeni e liberi appartenenti ai generi <i>Meloidogyne</i> , <i>Tylenchus</i> , <i>Trichodorus</i> , <i>Longidorus</i> , <i>Pratylenchus</i> , <i>Xiphinema</i> , <i>Globodera</i> , <i>Heterodera</i>	2-4 L/ha	1000 - 30000 l/ha	6 per ciclo colturale	10-14 giorni	0 giorni
Cucurbitacee con buccia commestibile (cetriolo, zucchini) Campo e serra		2-4 L/ha	1000 - 30000 l/ha	6 per ciclo colturale	10-14 giorni	0 giorni
Cucurbitacee con buccia non commestibile (melone, cocomero, zucca) Campo e serra		2-4 L/ha	1000 - 30000 l/ha	6 per ciclo colturale	10-14 giorni	0 giorni

* Vite contro nematode della vite (*Xiphinema index*): 2-4 L/ha, utilizzando volumi d'acqua di 10000-50000 L/ha.

Impiego in campo.

Epoca di impiego: dal germogliamento fino alla raccolta..

Intervallo tra interventi: minimo 15 giorni.

Numero massimo di interventi: 3 per ciclo colturale.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nell'imballaggio originale, in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dal gelo. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità garantita di almeno 2 anni.

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITA'

Nelle normali condizioni di impiego il prodotto non è fitotossico.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento.

NEMGUARD® è un marchio registrato da ECOSpray Ltd.

* Impiego autorizzato dal 9 aprile 2025 al 6 agosto 2025

NEMGUARD® SC

Sospensione concentrata (SC)

NEMATOCIDA A BASE DI ESTRATTO D'AGLIO PER SOLANACEE E CUCURBITACEE

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Estratto d'aglio (purezza 1000 g/kg) g 100,00 (= 1285 g/L)



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P261: Evitare di respirare i vapori.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P362+P364: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035-335313

Officina di produzione e confezionamento:

ECOspray Ltd. - 6c Park Farm Business Centre, Fornham St. Genevieve, Bury St. Edmunds, Suffolk, IP28 6TS, Gran Bretagna

Officina di confezionamento:

I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Kollant S.r.l. - via C. Colombo, 7/7a - 30030 Vigonovo (VE)

CBC (Europe) S.r.l. - Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 16742 del 11/07/2017

Contenuto netto: 0.5 - 1 - 5 - 10 - 20 litri.

Lotto n. del

Il prodotto è stabile per 2 anni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Conservare il recipiente ben chiuso.

Durante la normale manipolazione si sviluppa un forte odore di aglio, il quale può causare effetti di lacrimazione. Se dovesse accadere, portare il paziente all'aria fresca e, se necessario, lavare gli occhi con acqua. Se i sintomi persistono consultare un medico.

Informazioni per il medico: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE

Applicare NEMguard® SC al suolo di coltivazione mediante opportuno impianto di irrigazione, utilizzando volumi di acqua per ciclo di irrigazione compresi tra 1000-30000 L/ha. Le migliori condizioni per l'utilizzo del prodotto fitosanitario si ottengono quando il suolo è abbastanza umido. Si raccomanda quindi di aggiungere il prodotto all'acqua di irrigazione verso la fine del ciclo di irrigazione.

CARATTERISTICHE

NEMguard® SC è un nematocida a base di estratto d'aglio che agisce contro le forme libere (cioè gli stadi di sviluppo presenti nel terreno e non all'interno dei tessuti delle piante) di nematodi galligeni e liberi appartenenti ai generi *Meloidogyne*, *Tylenchus*, *Trichodorus*, *Longidorus*, *Pratylenchus*, *Xiphinema*, *Globodera*, *Heterodera*.

MODALITA' D'AZIONE

Coltura	Avversità	Dose	Volume di bagnatura	Numero di applicazioni/anno	Intervallo tra i trattamenti	Intervallo di sicurezza
Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana) Campo e serra	Nematodi galligeni e liberi appartenenti ai generi <i>Meloidogyne</i> , <i>Tylenchus</i> , <i>Trichodorus</i> , <i>Longidorus</i> , <i>Pratylenchus</i> , <i>Xiphinema</i> , <i>Globodera</i> , <i>Heterodera</i>	2-4 L/ha	1000 - 30000 l/ha	6 per ciclo culturale	10-14 giorni	0 giorni
Cucurbitacee con buccia commestibile (cetriolo, zucchini) Campo e serra		2-4 L/ha	1000 - 30000 l/ha	6 per ciclo culturale	10-14 giorni	0 giorni
Cucurbitacee con buccia non commestibile (melone, cocomero, zucca) Campo e serra		2-4 L/ha	1000 - 30000 l/ha	6 per ciclo culturale	10-14 giorni	0 giorni

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nell'imballo originale, in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dal gelo. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità garantita di almeno 2 anni.

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITA'

Nelle normali condizioni di impiego il prodotto non è fitotossico.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento.

NEMGUARD® è un marchio registrato da ECOSpray Ltd.

Rev. 0225

Etichetta autorizzata con D.D. del 01.02.2024 e modificata ai sensi dell'art 7, comma 1 del D.P.R n. 55/2012, con validità dal 28.04.2025