

DIFOL

Fungicida in sospensione concentrata
per il controllo della maculatura bruna del pero
CODICE FRAC G3, M04

DIFOL

COMPOSIZIONE

Difenoconazolo puro g 0,90 (=10,7 g/l)
Folpet puro g 30,32 (=360 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100



PERICOLO

Indicazioni di pericolo

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H332 Nocivo se inalato. H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Indicazioni supplementari

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P261 Evitare di respirare la nebbia/gli aerosol. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente secondo la normativa vigente

Globachem NV

Brustem Industriepark – Lichtenberglaan 2019 B-3800 Sint-Truiden (B)
tel. +32.11785717 - globachem@globachem.com

Distribuito da:

Belchim Crop Protection Italia S.p.A., Viale Milanofiori Strada 6 Palazzo
N3- 20089 Rozzano (MI)

Officine di produzione: Schirm GmbH – Geschwister Scholl Str. 127, D-39218 Schönebeck, Germany - Phyteurop – Z.I. de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay - France

Registrazione del Ministero della Salute n. 17871 del 16/06/2021

Contenuto netto

ml 100-150-250-500, litri 1-2-3-5-10-20 Partita ndel.....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare attrezzature dotate di ugelli con riduzione della deriva del 75% e rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 30 m, di cui 20 m vegetata, dai corpi idrici superficiali. Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di rispetto non trattata di 5 m da terreni non agricoli.

Protezione dell'operatore: indossare guanti ed indumenti protettivi adatti e dispositivi di protezione per occhi e viso durante la manipolazione del concentrato e l'applicazione del prodotto.

Tenere lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Tenere fuori della portata dei bambini. Conservare il contenitore originale ben chiuso in luogo sicuro. Sciacquare accuratamente il contenitore vuotandone il contenuto nel serbatoio dell'atomizzatore e riporlo in luogo sicuro. Proteggere dal gelo.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive Difenoconazolo 0,90% e Folpet 30,32% che separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione. **Sintomi:** organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

DIFOL è un fungicida a duplice azione, sistemica e di contatto, contenente difenoconazolo e folpet. Può essere utilizzato nella lotta contro la Maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*) quando si hanno le condizioni predisponenti la malattia.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Agitare bene prima dell'uso

Pero, contro maculatura bruna: effettuare fino a 3 trattamenti per anno alla dose di 3,5 l/ha in 300-1000 litri d'acqua con intervalli di 10 giorni quando si hanno le condizioni predisponenti la malattia.

Per volumi superiori di acqua, considerare la dose massima di 3,5 L/ha.

Preparazione della miscela

Assicurarsi che l'attrezzatura sia regolata per effettuare l'applicazione ad un volume corretto. Riempire il serbatoio con la metà del volume richiesto di acqua pulita e avviare l'agitatore. Aggiungere la quantità necessaria di DIFOL e continuare l'agitazione aggiungendo il resto dell'acqua. Agitare la miscela accuratamente prima dell'uso e continuare l'agitazione durante il trattamento. Fare particolare attenzione al fine di evitare sovrapposizioni durante il trattamento. Lavare accuratamente tutta l'attrezzatura con acqua immediatamente dopo l'uso

COMPATIBILITÀ

Le miscele devono essere effettuate in conformità alle norme vigenti ed alle raccomandazioni della buona pratica agricola. In caso di miscela con altro prodotto prepararne preventivamente una piccola quantità per accertare la compatibilità chimico-fisica e biologica secondo le particolari condizioni di utilizzo. La nostra società declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da miscele di prodotti diversi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA

Tutti i prodotti forniti sono di alta qualità e decliniamo ogni responsabilità per un utilizzo non corretto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 95 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
- Non applicare con mezzi aerei.
- Operare in assenza di vento.
- Da non vendersi sfuso.
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
- Il contenitore non può essere riutilizzato.