Etichetta/foglio illustrativo

BORDORAM 20 WG PFnPE

Poltiglia bordolese essiccata per piante destinate al consumo alimentare su superfici fino a 50 m^2

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC M1

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

BORDORAM 20 WG PFnPE - Registrazione Ministero della Salute n° 18265 del 30/12/2022

COMPOSIZIONE
RAME METALLO
(da Poltiglia Bordolese) g. 20
Coformulanti q.b. a g. 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione: IQV ITALIA S.r.l. - Via Carlo Dell´Acqua, 7 - 20027 Rescaldina (MI) Tel 0331 745784

Il prodotto conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore è stabile per 2 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione. Partita n. …… Contenuto netto:

RIVOLGERSI AL VENDITORE per informazioni o per consigli sull'uso di questo prodotto e sulla taglia da acquistare più adatta alle proprie esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell'estensione dell'area. Per evitare o limitare la conservazione domestica di prodotti potenzialmente pericolosi, con rischio di danni accidentali a persone o all'ambiente**, non acquistare quantitativi eccedenti il proprio fabbisogno**.

LEGGERE CON ATTENZIONE L'ETICHETTA e/o IL FOGLIO ILLUSTRATIVO: il rispetto di tutte le indicazioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante, comprese quelle trattate, e agli animali.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di contatto con la cute o gli occhi lavare abbondantemente la parte.
In caso di ingestione accidentale o di malessere consultare il medico mostrando l'etichetta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE E LA MANIPOLAZIONE IN SICUREZZA

- Conservare nel **contenitore originale ben chiuso, in armadietto chiuso** a chiave **in luogo fresco ed asciutto, che non sia accessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali.**
- Durante la preparazione e l'applicazione della soluzione proteggersi adeguatamente indossando **pantaloni lunghi e maglietta a maniche lunghe**. Si consiglia l'uso di **guanti** impermeabili.
- Manipolare ed aprire la confezione con cautela. Evitare l'inalazione e ogni tipo di contatto diretto.
- Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego del prodotto.

AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO

- **Non contaminare l'acqua con il prodotto e il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade (Sp1).**
- Terminato il trattamento sciacquare il contenitore vuoto del prodotto fitosanitario e l'attrezzatura utilizzata per l'applicazione. Eseguire il lavaggio restando nell'area trattata, non in prossimità di corsi di acqua, e distribuire l'acqua di lavaggio sulla coltura trattata. NON gettare l'acqua di lavaggio nelle fognature, attraverso gli scarichi domestici o i sistemi di scolo della strada.
- **Non disperdere la confezione e il contenitore vuoto nell'ambiente e smaltirli secondo le norme vigenti in materia di riciclo dei rifiuti.**
- **Non riutilizzare il contenitore vuoto.**

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Il BORDORAM 20 WG PFnPE è un anticrittogamico in granuli idrodispersibili a base di rame solfato neutralizzato con calce idrata. È efficace contro numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree. La dispersione della poltiglia in acqua è facile in tutte le circostanze: basta versare i granuli nel quantitativo di acqua ed agitare. Il BORDORAM 20 WG PFnPE viene distribuito mediante irroratrice a volume normale impiegando i quantitativi di acqua indicati di seguito.

Il rame tende ad accumularsi nel suolo alterandone negativamente le caratteristiche, inoltre può causare danni agli organismi viventi, in particolare quelli del suolo e delle acque. Per tale ragione, sulla base delle norme europee e nazionali, è vietato l'uso di rame in quantità superiori a 4 kg per ettaro (20 grammi di rame per 50 metri quadrati) in un anno come somma di uso su tutte le colture trattate. Pertanto, considerando tutte le colture che si intende trattare, le rispettive dosi indicate in questa etichetta e il numero massimo di applicazioni consentite per anno, non applicare un quantitativo complessivo di questo prodotto superiore a 100 grammi (pari a 20 grammi di rame) per 50 metri quadrati nel corso dell'anno. Se si utilizzano altri prodotti fitosanitari a base di rame si tenga conto del quantitativo di rame complessivamente distribuito su tutte le colture al fine di non superare i limiti di utilizzo per anno.

Etichetta autorizzata con D.D. del 30/12/2022 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 27/08/2023

IMPIEGHI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'USO
Intervenire al verificarsi delle condizioni climatiche favorevoli alle avversità. Utilizzare la dose più alta in caso di elevata pressione della malattia.

Coltura	Malattie	Epoca d'impigo	Dosi ($g/10m^2$)	Volumi d'acqua ($L/10m^2$)	Dosi ($g/50m^2$)	Volumi d'acqua ($L/50m^2$)	Numero applicazioni	Intervallo tra le applicazioni (giorni)
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Antracnosi (*Elsinoe spp. Colletorichum spp*), Batteriosi (*Xanthomonas spp.*)	Iniziare i trattamenti quando la vegetazione ha uno sviluppo di circa 10 cm	3,75-5	0,4-1	18,75-25	2-5	4-6	7
Olivo	Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*), Lebbra (*Gloeosporium olivarum, Colletotrichum gloeosporioides*), Batteriosi (*Pseudomonas spp.*)	Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e fino all'invaiatura	3,75-5	0,6-1	18,75-25	3-5	2-6	7
POMACEE (melo, pero, cotogno, nespolo)	Ticchiolatura, Cancri rameali, Marciume (*Nectria spp., Venturia spp., Monilia spp.*), Batteriosi (*Erwinia spp., Pseudomonas spp.*)	Trattamenti autunnali (dopo la raccolta) e alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura	3,75-5	0,5-1	18,75-25	2,5-5	2-4	7
DRUPACEE (pesco, albicocco, susino, ciliegio, nettarine)	Bolla (*Taphrina spp.*), Corineo (*Coryneum spp.*), Marciume (*Monilia spp.*), Cilindrosporiosi del ciliegio, (*Blumeriella japii*), Seccume rameale (*Cytospora leucostoma*), Batteriosi (*Pseudomonas spp.*) e Vaiolatura (*Stigmina carpophila*)	Trattamenti autunnali (dal 50% di caduta foglie) e alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura	3,75-5	0,4-1	18,75-25	2-5	2-4	7
MANDORLO	Bolla (*Taphrina spp.*), Corineo (*Coryneum spp.*), Marciume (*Monilia spp.*), Batteriosi (*Pseudomonas spp.*), Vaiolatura *(Stigmina carpophila)*	Trattamenti autunnali (dal 50% di caduta foglie) e alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura	3,75-5	0,5-1	18,75-25	2,5-5	2-4	7
FRUTTIFERI CON FRUTTA A GUSCIO (noce, nocciolo, castagno, pistacchio)	Alternariosi *(Alternaria spp.),* Batteriosi *(Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.*), Mal dello stacco del nocciolo (*Cytospora spp.*), Fersa del castagno (*Mycosphaerella spp.*)	Trattamenti autunnali (dal 50% di caduta foglie) e alla ripresa vegetativa fino alla fase di pre-fioritura	3,75-5	0,5-1	18,75-25	2,5-5	2-4	7
AGRUMI (arancio, limone, mandarino, pompelmo)	Gommosi (*Phytophthora spp.*), Maculatura bruna (*Alternaria spp.*), Piticchia batterica (*Pseudomonas syringae*)	Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguirli fino a due settimane prima della raccolta	3,75-5	1-2	18,75-25	5-10	3-5	7
SOLANACEE (pomodoro, melanzana) in campo e in serra; **CAVOLI A INFIORESCENZA (cavolfiore, cavoli broccoli)** in campo; **CUCURBITACEE A BUCCIA COMMESTIBILE (cetriolo, cetriolino, zucchino)** in campo e in serra; **CUCURBITACEE A BUCCIA NON COMMESTIBILE (melone, cocomero, zucca)** in campo:	Peronospora (*Phytophthora spp., Bremia spp., Peronospora spp., Pseudoperonospora spp.*), Alternariosi (*Alternaria spp.*), Antracnosi (*Colletotrichum spp.*), Batteriosi (*Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.*)	A partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta	3,75-5	0,4-1	18,75-25	2-5	3-6	7
ORTAGGI A BULBO (cipolla, aglio, scalogno) in campo; **LATTUGHE E ALTRE INSALATE** in campo e in serra; **SPINACI E SIMILI** in campo e in serra	Peronospora (*Peronospora spp., Phythophtora spp., Bremia spp.*), Ruggine (*Stemphylium spp.*), Antracnosi (*Marssonina spp., Colletotrichum spp.),* Alternariosi (*Alternaria spp.*), Batteriosi (*Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.*), Sclerotinia *(Sclerotinia spp.)*	A partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta	3,75-5	0,4-1	18,75-25	2-5	3-6	7
LEGUMI FRESCHI (fagiolo, fagiolino, pisello, pisello mangiatutto, lenticchia) in campo	Antracnosi (*Colletotrichum spp., Marssonina spp.*), Peronospora (*Peronospora spp.*), Septoriosi (*Septoria spp.*), Batteriosi (*Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.*) Ruggine (*Uromyces spp.*)	A partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta	3,75-5	0,4-1	18,75-25	2-5	3-6	7
PATATA in campo	Peronospora (*Phytophtora spp.*), Alternariosi (*Alternaria spp.*), Antracnosi (*Colletotrichum spp.*), Batteriosi (*Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.*)	A partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-raccolta	3,75-5	0,4-1	18,75-25	2-5	3-6	7

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE
BORDORAM 20 WG (PFnPE) può essere utlilizzato mediante irroratrici spalleggiate azionate a mano o a motore oppure lancia a mano collegata ad un serbatoio. Il prodotto va versato direttamente nel serbatoio già riempito a metà, poi aggiungere l'acqua rimanente ed agitare energicamente.

Preparare la soluzione **solo al momento dell'utilizzo in misura non eccedente il quantitativo necessario** al trattamento; per evitare residui di soluzione **pianificare il trattamento** valutando attentamente l'estensione dell'area/il numero delle piante da trattare, seguire scrupolosamente le istruzioni per la preparazione della miscela e prelevare il prodotto secondo le dosi indicate.

Per evitare residui di soluzione **pianificare il trattamento** valutando attentamente il numero delle piante da trattare. **Non applicare su una superficie totale superiore a 50 m^2**.

Non utilizzare in presenza di vento. Non utilizzare in miscela con altri prodotti fitosanitari né con coadiuvanti di prodotti fitosanitari, con fertilizzanti, corroboranti o altri prodotti per la cura delle piante.

Evitare il contatto con la vegetazione trattata e **attendere almeno 24 ore dal trattamento** prima di rientrare nell'area ed eseguire eventuali lavorazioni sulla coltura trattata. **Non consentire l'accesso nell'area per almeno 24 ore dal trattamento**, con particolare riguardo a bambini e altri soggetti vulnerabili quali, ad es. le donne incinte o in allattamento e gli anziani.

INTERVALLO DI SICUREZZA: per la sicurezza del consumo alimentare **rispettare un intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta di:**
3 giorni su cetriolo, cetriolino, zucchino, pomodoro e melanzana in serra, cipolla, aglio, scalogno, fagiolo, fagiolino, pisello, pisello mangiatutto, lenticchia. 7 giorni su melone, cocomero, zucca, lattughe e altre insalate, spinaci e simili. 10 giorni su pomodoro e melanzana in campo. 14 giorni su agrumi, olivo, cavoli a infiorescenza, patata. 21 giorni su vite.
Su pomacee, drupacee, mandorlo e fruttiferi a guscio sospendere i trattamenti prima dell'inizio della fioritura.

Etichetta autorizzata con D.D. del 30/12/2022 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 27/08/2023

Per ortaggi a maturazione e raccolta scalare applicare il prodotto fitosanitario solo dopo la raccolta dei frutti che hanno raggiunto la maturazione o sono prossimi alla maturazione e attendere in ogni caso che sia trascorso l'intervallo di sicurezza di almeno 3 giorni prima del raccolto successivo.

Distribuito da: ITAL-AGRO S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel. 0371-71090

Stabilimenti di produzione:
Industrias Químicas del Vallés, S.A. - Mollet del Vallés, Barcelona (Spagna)
Industrias Químicas del Vallés, S.A. - Cheste, Valencia (Spagna)

Contenuto netto: 5-10-25g

La confezione da 25g è dotata di misurino dosatore che consente il prelievo della corretta dose di prodotto.

SEGNALAZIONI: al fine di consentire il miglioramento della sicurezza del prodotto segnalare eventuali problematiche di tipo sanitario, risolte con o senza intervento medico, o ambientale oppure difficoltà di prelievo o di dosaggio o altre problematiche rilevate, al numero di telefono o al sito web del distributore.

Etichetta autorizzata con D.D. del 30/12/2022 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 27/08/2023

Etichetta formato ridotto

BORDORAM 20 WG PFnPE

Poltiglia bordolese essiccata per piante destinate al consumo alimentare su superfici fino a 50 m^2

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC M1

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

BORDORAM 20 WG PFnPE - Registrazione Ministero della Salute n° 18265 del 30/12/2022

COMPOSIZIONE
RAME METALLO
(da Poltiglia Bordolese) g. 20
Coformulanti q.b. a g. 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione: IQV ITALIA S.r.l. - Via Carlo Dell´Acqua, 7 - 20027 Rescaldina (MI) Tel 0331 745784

Il prodotto conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore è stabile per 2 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione. Partita n. ……
Contenuto netto:

RIVOLGERSI AL VENDITORE per informazioni o per consigli sull'uso di questo prodotto e sulla taglia da acquistare più adatta alle proprie esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell'estensione dell'area. Per evitare o limitare la conservazione domestica di prodotti potenzialmente pericolosi, con rischio di danni accidentali a persone o all'ambiente**, non acquistare quantitativi eccedenti il proprio fabbisogno**.

LEGGERE CON ATTENZIONE L'ETICHETTA e/o IL FOGLIO ILLUSTRATIVO: il rispetto di tutte le indicazioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante, comprese quelle trattate, e agli animali.

Distribuito da: ITAL-AGRO S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel. 0371-71090

Stabilimenti di produzione:
Industrias Químicas del Vallés, S.A. - Mollet del Vallés, Barcelona (Spagna)
Industrias Químicas del Vallés, S.A. - Cheste, Valencia (Spagna)

Contenuto netto: 5-10-25g
La confezione da 25g è dotata di misurino dosatore che consente il prelievo della corretta dose di prodotto.

Etichetta autorizzata con D.D. del 30/12/2022 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 27/08/2023

BORDORAM 20 WG PFnPE

Poltiglia bordolese essiccata per vite e olivo su superfici fino a 5000 m^2

GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC M1

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

BORDORAM 20 WG PFnPE - Registrazione Ministero della Salute n° 18265 del 30/12/2022

COMPOSIZIONE
RAME METALLO
(da Poltiglia Bordolese) g. 20
Coformulanti q.b. a g. 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione: IQV ITALIA S.r.l. - Via Carlo Dell´Acqua, 7 - 20027 Rescaldina (MI) Tel 0331 745784

Il prodotto conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore è stabile per 2 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione. Partita n. …… Contenuto netto:

RIVOLGERSI AL VENDITORE per informazioni o per consigli sull'uso di questo prodotto e sulla taglia da acquistare più adatta alle proprie esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell'estensione dell'area. Per evitare o limitare la conservazione domestica di prodotti potenzialmente pericolosi, con rischio di danni accidentali a persone o all'ambiente**, non acquistare quantitativi eccedenti il proprio fabbisogno**.

LEGGERE CON ATTENZIONE L'ETICHETTA e/o IL FOGLIO ILLUSTRATIVO: il rispetto di tutte le indicazioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante, comprese quelle trattate, e agli animali.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di contatto con la cute o gli occhi lavare abbondantemente la parte.
In caso di ingestione accidentale o di malessere consultare il medico mostrando l'etichetta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE E LA MANIPOLAZIONE IN SICUREZZA

- Conservare nel **contenitore originale ben chiuso, in armadietto chiuso** a chiave **in luogo fresco ed asciutto, che non sia accessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali.**
- Durante la preparazione e l'applicazione della soluzione proteggersi adeguatamente indossando **pantaloni lunghi e maglietta a maniche lunghe**. Si consiglia l'uso di **guanti** impermeabili.
- Manipolare ed aprire la confezione con cautela. Evitare l'inalazione e ogni tipo di contatto diretto.
- Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego del prodotto.

AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO

- **Non contaminare l'acqua con il prodotto e il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade (Sp1).**
- Terminato il trattamento sciacquare il contenitore vuoto del prodotto fitosanitario e l'attrezzatura utilizzata per l'applicazione. Eseguire il lavaggio restando nell'area trattata, non in prossimità di corsi di acqua, e distribuire l'acqua di lavaggio sulla coltura trattata. NON gettare l'acqua di lavaggio nelle fognature, attraverso gli scarichi domestici o i sistemi di scolo della strada.
- **Non disperdere la confezione e il contenitore vuoto nell'ambiente e smaltirli secondo le norme vigenti in materia di riciclo dei rifiuti.**
- **Non riutilizzare il contenitore vuoto.**

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Il BORDORAM 20 WG PFnPE è un anticrittogamico in granuli idrodispersibili a base di rame solfato neutralizzato con calce idrata. È efficace contro numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture di olivo e vite. La dispersione della poltiglia in acqua è facile in tutte le circostanze: basta versare i granuli nel quantitativo di acqua ed agitare. Il BORDORAM 20 WG PFnPE viene distribuito mediante irroratrice a volume normale impiegando i quantitativi di acqua indicati di seguito.

Il rame tende ad accumularsi nel suolo alterandone negativamente le caratteristiche, inoltre può causare danni agli organismi viventi, in particolare quelli del suolo e delle acque. Per tale ragione, sulla base delle norme europee e nazionali, è vietato l'uso di rame in quantità superiori a 4 kg per ettaro (2 Kg di rame per 5000 metri quadrati) in un anno come somma di uso su tutte le colture trattate. Pertanto, considerando tutte le colture che si intende trattare, le rispettive dosi indicate in questa etichetta e il numero massimo di applicazioni consentite per anno, non applicare un quantitativo complessivo di questo prodotto superiore a 10 Kg (pari a 2 Kg di rame) per 5000 metri quadrati nel corso dell'anno. Se si utilizzano altri prodotti fitosanitari a base di rame si tenga conto del quantitativo di rame complessivamente distribuito su tutte le colture al fine di non superare i limiti di utilizzo per anno.

Etichetta autorizzata con D.D. del 30/12/2022 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 27/08/2023

IMPIEGHI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'USO
Intervenire al verificarsi delle condizioni climatiche favorevoli alle avversità. Utilizzare la dose più alta in caso di elevata pressione della malattia.

Coltura	Malattie	Epoca d'impigo	Dosi ($g/100m^2$)	Volumi d'acqua ($L/100m^2$)	Dosi ($g/1000m^2$)	Volumi d'acqua ($L/1000m^2$)	Numero applicazioni	Intervallo tra le applicazioni (giorni)
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Antracnosi (*Elsinoe spp. Colletorichum spp*), Batteriosi (*Xanthomonas spp.*)	Iniziare i trattamenti quando la vegetazione ha uno sviluppo di circa 10 cm	37,5-50	4-10	375-500	40-100	4-6	7
Olivo	Occhio di Pavone (*Spilocaea oleaginea*), Lebbra (*Gloeosporium olivarum, Colletotrichum gloeosporioides*), Batteriosi (*Pseudomonas spp.*)	Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e fino all'invaiatura	37,5-50	6-10	375-500	60-100	2-6	7

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE
BORDORAM 20 WG PFnPE può essere utlilizzato mediante irroratrici spalleggiate azionate a mano o a motore oppure lancia a mano collegata ad un serbatoio. Il prodotto va versato direttamente nel serbatoio già riempito a metà, poi aggiungere l'acqua rimanente ed agitare energicamente..

Preparare la soluzione **solo al momento dell'utilizzo in misura non eccedente il quantitativo necessario** al trattamento; per evitare residui di soluzione **pianificare il trattamento** valutando attentamente l'estensione dell'area/il numero delle piante da trattare, seguire scrupolosamente le istruzioni per la preparazione della miscela e prelevare il prodotto secondo le dosi indicate.

La confezione è dotata di misurino dosatore che consente il prelievo della corretta dose di prodotto. Per evitare residui di soluzione **pianificare il trattamento** valutando attentamente il numero delle piante da trattare. **Non applicare su una superficie totale superiore a 5000m^2**.

Non utilizzare in presenza di vento. Non utilizzare in miscela con altri prodotti fitosanitari né con coadiuvanti di prodotti fitosanitari, con fertilizzanti, corroboranti o altri prodotti per la cura delle piante.

Evitare il contatto con la vegetazione trattata e **attendere almeno 24 ore dal trattamento** prima di rientrare nell'area ed eseguire eventuali lavorazioni sulla coltura trattata. **Non consentire l'accesso nell'area per almeno 24 ore dal trattamento**, con particolare riguardo a bambini e altri soggetti vulnerabili quali, ad es. le donne incinte o in allattamento e gli anziani.

INTERVALLO DI SICUREZZA: per la sicurezza del consumo alimentare **rispettare un intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta di 14 giorni su olivo e 21 giorni su vite.**

Distribuito da: ITAL-AGRO S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel. 0371-71090

Stabilimenti di produzione:
Industrias Químicas del Vallés, S.A. - Mollet del Vallés, Barcelona (Spagna)
Industrias Químicas del Vallés, S.A. - Cheste, Valencia (Spagna)

Contenuto netto: 0,1-0,2-0,25-0,4-0,5-0,8-1-2 Kg

SEGNALAZIONI: al fine di consentire il miglioramento della sicurezza del prodotto segnalare eventuali problematiche di tipo sanitario, risolte con o senza intervento medico, o ambientale oppure difficoltà di prelievo o di dosaggio o altre problematiche rilevate, al numero di telefono o al sito web del distributore.

Etichetta autorizzata con D.D. del 30/12/2022 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 27/08/2023

Etichetta formato ridotto

BORDORAM 20 WG PFnPE

Poltiglia bordolese essiccata per vite e olivo su superfici fino a 5000 m²
GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)
MECCANISMO D'AZIONE: FRAC M1
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

BORDORAM 20 WG PFnPE - Registrazione Ministero della Salute n° 18265 del 30/12/2022

COMPOSIZIONE
RAME METALLO
(da Poltiglia Bordolese) g. 20
Coformulanti q.b. a g. 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione: IQV ITALIA S.r.l. - Via Carlo Dell´Acqua, 7 - 20027 Rescaldina (MI) Tel 0331 745784

Il prodotto conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore è stabile per 2 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione. Partita n. ……
Contenuto netto:

RIVOLGERSI AL VENDITORE per informazioni o per consigli sull'uso di questo prodotto e sulla taglia da acquistare più adatta alle proprie esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell'estensione dell'area. Per evitare o limitare la conservazione domestica di prodotti potenzialmente pericolosi, con rischio di danni accidentali a persone o all'ambiente**, non acquistare quantitativi eccedenti il proprio fabbisogno**.

LEGGERE CON ATTENZIONE L'ETICHETTA e/o IL FOGLIO ILLUSTRATIVO: il rispetto di tutte le indicazioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante, comprese quelle trattate, e agli animali.

Distribuito da: ITAL-AGRO S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel. 0371-71090

Stabilimenti di produzione:
Industrias Químicas del Vallés, S.A. - Mollet del Vallés, Barcelona (Spagna)
Industrias Químicas del Vallés, S.A. - Cheste, Valencia (Spagna)

Contenuto netto: 0,1 Kg

Etichetta autorizzata con D.D. del 30/12/2022 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 27/08/2023