

BEAST

Diserbante graminicida di post-emergenza del frumento e dell'orzo.

(Emulsione olio/acqua)

Meccanismo d'azione: HRAC A

Registrazione del Ministero della Salute n° 18562 del 22/07/2024

Titolare dell'Autorizzazione

Sharda Cropchem España S.L. – Edificio Atalayas Business Center, Carril
Condomina n°3, 2th Floor - 30006 Murcia, Spagna - Tel. 02 3604 2884

100 grammi di prodotto contengono:

Fenoxaprop-p-ethyl puro g 6,7 g (pari a 69 g/L)

Coformulanti* q. b. a g 100

*Contiene Cloquintocet-mexyl, 1,2 benzisothiazol-3(2H)-one e Nafta solvente (petrolio)

Partita n. Contenuto: 0,500-1-5 L

Officina di produzione:

Synthos AGRO Sp. z o.o. ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim, Poland Zhejiang
Udragon Pesticides and Chemicals Co., Ltd Address :No.172, Zhangjiadun
Road, Tangxi Town, Yuhang District, Hangzhou,Zhejiang, China

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non

mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare

guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.

REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362 Togliersi di

dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. **SMALTIMENTO:**

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.



ATTENZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

BEAST è assorbito dalle infestanti attraverso le foglie, il principio attivo viene traslocato fino agli apici vegetativi. L'azione erbicida si manifesta con decolorazioni clorotiche su tutta la pianta; per il completo disseccamento occorrono dalle 2 alle 4 settimane. Le condizioni climatiche possono influenzare la rapidità d'azione del prodotto. Infestanti in stati vegetativi non ottimali dovuti per esempio a siccità od altre cause biotiche, possono influenzare l'efficacia di BEAST.

Infestanti sensibili: Avena (*Avena spp.*), coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), falaride (*Phalaris spp.*),

finarola comune (*Poa trivialis*), cappellini dei campi (*Apera spica venti*)

Infestanti resistenti: Loglio (*Lolium spp.*)

DOSI e MODALITÀ di IMPIEGO

- **Frumento tenero e duro: 0,8 – 1,2 L/ha** contro *Avena spp.*, *Phalaris spp.*, *Poa trivialis* e *Apera spica venti*; **0,6 – 1 L/ha** contro *Alopecurus myosuroides*
- **Orzo: 0,8 – 1 l/ha** contro *Avena spp.*, *Phalaris spp.*, *Poa trivialis* e *Apera spica venti*; **0,6 – 1 L/ha** contro *Alopecurus myosuroides*

Su entrambe le colture applicare le dosi ridotte in presenza di infestazioni contenute e con interventi su infestanti ai primi stadi si sviluppo

EPOCHE di IMPIEGO: dallo stadio della terza foglia fino alla levata del frumento e dell'orzo, con le infestanti preferibilmente agli stadi compresi tra la seconda foglia ed il secondo nodo (non impiegare dopo BBCH 32). Per il controllo ottimale della *Phalaris spp.* si deve intervenire entro la fine dell'accestimento dell'infestante.

VOLUME di IRRORAZIONE

Applicare 200 - 400 L di miscela per ettaro.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'ACCCase. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione culturale e la falsa semina.

COMPATIBILITÀ

Si sconsiglia la miscela estemporanea con ormonici sotto forma di sale, con dicamba, bifenox e bentazone in quanto sono possibili riduzioni di efficacia.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. **Non trattare l'orzo dopo lo stadio di levata.**

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto

di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO