

## MINISTERO DELLA SALUTE

### DECRETO 22 luglio 2003 (GU n. 177 del 1-8-2003)

Applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acifluorfen che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE  
della sanita' pubblica veterinaria  
degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l'acifluorfen, nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento, che stabilisce la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive entro il 25 luglio 2003;

Visto l'art. 2, comma 3, del suddetto regolamento, che stabilisce per l'Italia la possibilita' di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di acifluorfen per il controllo degli organismi nocivi su soia (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detto impiego;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, procedendo alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti acifluorfen, elencati nell'allegato A al presente decreto, e al mantenimento in vigore delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato B al presente decreto, che erano gia' autorizzati per l'impiego su soia e per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, e' fissato al 31 dicembre 2003 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti acifluorfen di cui all'allegato A al presente decreto, nonche' delle confezioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato B che riportano in etichetta usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 3, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, e' fissato entro il 31 dicembre 2007 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari che sono elencati nell'allegato B al presente decreto e che sono stati sottoposti all'adeguamento delle etichette per gli usi ora ritenuti essenziali;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su soia (usi essenziali) dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva acifluorfen non e' iscritta nel l'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acifluorfen, riportati nell'allegato A al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acifluorfen, riportati nell'allegato B al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno 2007 limitatamente al solo impiego su soia (usi essenziali) e in conformita' alle condizioni indicate nelle rispettive etichette riportate in allegato C al presente decreto.

Art. 4.

1. Sono consentiti fino al 31 dicembre 2003 la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti acifluorfen, che:

sono elencati nell'allegato A;

sono elencati nell'allegato B, limitatamente alle confezioni che riportano in etichetta usi diversi da quelli essenziali indicati nell'ultima colonna del citato allegato B.

2. E' fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti acifluorfen di cui all'allegato B al presente decreto che sono stati sottoposti all'adeguamento delle etichette per gli usi ora ritenuti essenziali.

3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti acifluorfen sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca dei prodotti di cui all'allegato A, delle limitazioni e delle nuove condizioni di impiego fissate per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato B, nonche' del rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal 26 luglio 2003.

Roma, 22 luglio 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato A  
PRODOTTI A BASE DI ACIFLUORFEN LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE  
IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa
Scout	007039	14.04.1987	Bayer Cropscience S.r.l.

Allegato B

PRODOTTI A BASE DI ACIFLUORFEN LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE  
IN COMMERCIO SONO PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE  
ALL'IMPIEGO SU SOIA (USI ESSENZIALI)

```
=====
Prodotto          | N. reg.   | Data reg.   | Impresa   | Usi essenziali
fitosanitario     |           |             |           | concessi
=====
Galaxi            | 010431    | 12.04.2000  | Basf A.G. | Soia
-----
Blazer 2L         | 007038    | 14.04.1987  | Basf A.G. | Soia
-----
```

Allegato C

ETICHETTE DEI PPFF DELL'ALLEGATO B

Vedere allegato alle pagg. 12 - 13 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.


ALLEGATO C

## ETICHETTE DEI PPFF DELL'ALLEGATO B

**ERBICIDA DI POST-EMERGENZA  
PER LA SOIA  
CONCENTRATO SOLUBILE**

**GALAXY****COMPOSIZIONE:**

100 grammi di prodotto contengono:  
BENTAZONE puro g 30,3 (=360 g/l)  
(da sale sodico)  
ACIFLUORFEN puro g 6,3 (=75,5 g/l)  
(da sale sodico)  
Coformulanti q.b. a g 100

**IRRITANTE****FRASI DI RISCHIO:**

Nocivo per ingestione - Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**

Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

**BASF Agro Spa**  
Cesano Maderno (Milano)

**Stabilimento di produzione:**

BASF Aktiengesellschaft - Ludwigshafen - Germania

**PRODOTTO FITOSANITARIO**

Reg. del Ministero della Sanità n. 10431 del 12.04.2000

**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

**Contenuto netto: 0,5 - 1 - 5 - 10 litri**

**Partita n.**

© Marchio registrato

FORMULA PROTETTA

Non usare GALAXY in presenza di persone, animali o piante da trattare.

Evitare l'uso di GALAXY in presenza di persone, animali o piante da trattare.

Evitare l'uso di GALAXY in presenza di persone, animali o piante da trattare.

Evitare l'uso di GALAXY in presenza di persone, animali o piante da trattare.

Evitare l'uso di GALAXY in presenza di persone, animali o piante da trattare.

Evitare l'uso di GALAXY in presenza di persone, animali o piante da trattare.

Evitare l'uso di GALAXY in presenza di persone, animali o piante da trattare.

Evitare l'uso di GALAXY in presenza di persone, animali o piante da trattare.

Evitare l'uso di GALAXY in presenza di persone, animali o piante da trattare.

Evitare l'uso di GALAXY in presenza di persone, animali o piante da trattare.

Evitare l'uso di GALAXY in presenza di persone, animali o piante da trattare.

Evitare l'uso di GALAXY in presenza di persone, animali o piante da trattare.

Evitare l'uso di GALAXY in presenza di persone, animali o piante da trattare.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.**

Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

GALAXY è un erbicida con azione di contatto per il controllo in post-emergenza di alcune infestanti a foglia larga della soia. La particolare combinazione di bentazone ed acifluorfen consente il controllo totale d'*Amaranthus retroflexus*.

**Infestanti controllate:**

amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), atriplice (*Atriplex spp.*), borsapastore comune (*Capsella bursa-pastoris*), cencio molle (*Abutilon theophrasti*), coriandolo puzzolente (*Bifora radians*), erba morella (*Solanum nigrum*), farinello comune (*Chenopodium album*), farinello polispero (*Chenopodium polyspermum*), forbicina (*Bidens spp.*), galinsoga (*Galinsoga parviflora*), mercorella comune (*Mercurialis annua*), nappola (*Xanthium spp.*), poligono convolvolo (*Fallopia convolvulus*), poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), stramonio comune (*Datura stramonium*), vilucchio bianco (*Calystegia sepium*), vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), visnaga maggiore (*Ammi majus*).

**DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO**

GALAXY si impiega: in post-emergenza della soia, alla dose di 1,5-2,5 litri per ettaro, con 300 litri di acqua per ettaro, con infestanti piccole (2-4 foglie) ed in attivo sviluppo.

**Avvertenze agronomiche**

Non applicare GALAXY su colture in condizioni di stress, dovute per esempio a: grandinate, allagamenti, siccità o forti escursioni termiche.

Non applicare GALAXY su colture danneggiate (fitotossicità fogliare e/o brachizzazione) da precedenti trattamenti erbicidi.

Trattamenti localizzati nel solco di semina con preparati insetticidi/nematocidi possono predisporre la coltura a danni da GALAXY.

Non usare GALAXY con temperature insolitamente basse per la stagione o durante lunghi periodi di siccità, poiché l'efficacia diserbante potrebbe essere insoddisfacente.

Pioggie cadute appena dopo l'applicazione possono ridurre l'efficacia del prodotto. Si sconsiglia pertanto di trattare se minaccia di piovare.

**PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA**

Versare il contenuto direttamente nella botte, riempita a metà, mantenendo in funzione l'agitatore. Portare quindi a volume.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA**

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

**ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO: smaltire secondo le norme vigenti.**

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

Aprile 2003

## ERBICIDA SELETTIVO DI PRE-EMERGENZA E DI POST-EMERGENZA PER LA SOIA LIQUIDO EMULSIONABILE


### BLAZER 2 L

#### COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:  
ACIFLUORFEN puro g 19,9 (=235 g/l)  
Coformulanti q.b. a g 100

#### FRASI DI RISCHIO:

Irritante per gli occhi e la pelle.



**IRRITANTE**

#### CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

**BASF Agro Spa**  
Cesano Maderno (Milano)

**PRODOTTO FITOSANITARIO**  
Reg. del Min. della Sanità n. 7038 del 14.04.1987

#### Officina di produzione:

DOW Agrosiences B.V. - LA PORTE - TEXAS 77571 (USA)  
BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen - Germania

#### Stabilimento di confezionamento:

ALTHALLER ITALIA srl - 20078 San Colombano al Lambro (MI)  
AGRIFORMULA s.r.l. - Paganica (AQ)

**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

**Contenuto netto: 1 - 5 - 10 - 15 - 25 litri**  
**Partita n.**

© Marchio registrato

NOTA: IL PRODOTTO E'...

Non usare piante trattate come foraggio.  
Non trattare se la pioggia è prevista entro 6-8 ore.  
Non trattare in periodi di siccità.

#### IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Salvo autorizzazione del Ministero della Sanità, il prodotto non deve essere utilizzato in modo diverso da quello indicato in questa etichetta. Il prodotto è destinato all'uso agrario e non deve essere utilizzato in modo diverso da quello indicato in questa etichetta. Il prodotto è destinato all'uso agrario e non deve essere utilizzato in modo diverso da quello indicato in questa etichetta. Il prodotto è destinato all'uso agrario e non deve essere utilizzato in modo diverso da quello indicato in questa etichetta.

Quando si utilizza il prodotto, si deve seguire le istruzioni riportate sulla confezione. Il prodotto è destinato all'uso agrario e non deve essere utilizzato in modo diverso da quello indicato in questa etichetta.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.**

Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

BLAZER 2 L è un erbicida selettivo di pre-emergenza e di post-emergenza per la lotta contro le malerbe annuali che infestano la soia. Agisce per contatto.

**Infestanti sensibili:** cencio molle (*Abutilon theophrasti*), amaranto (*Amaranthus spp.*), ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*), farinello (*Chenopodium spp.*), stramonio comune (*Datura stramonium*), poligono (*Polygonum spp.*), ibisco vescicoso (*Hibiscus trionum*), senape (*Sinapis spp.*), erba morella (*Solanum nigrum*), nappola italiana (*Xanthium strumarium*).

#### DOSI, EPOCHI E MODALITÀ D'IMPIEGO

##### Applicazione di pre-emergenza:

**2-3 litri per ettaro**, distribuiti con 300 litri d'acqua.

Per completare lo spettro d'azione si consiglia l'aggiunta di un graminicida.

##### Applicazione di post-emergenza:

**1,5-2 litri per ettaro**, distribuiti con 300 litri d'acqua.

Trattare quando le infestanti sono allo stadio di 2-4 foglie vere. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante-adesevante.

#### PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

1. Versare il prodotto nell'irroratrice già riempita a metà.
2. Mettere in azione l'agitatore (che deve funzionare fino alla fine del trattamento).
3. Portare a volume.

#### COMPATIBILITÀ

Nelle applicazioni di pre-emergenza, BLAZER 2 L può essere miscelato con erbicidi ad azione graminicida. Nelle applicazioni di post-emergenza il prodotto si impiega da solo o in miscela con un bagnante-adesevante.

#### FITOTOSSICITÀ

In certe condizioni si possono osservare leggeri sintomi di fitotossicità, alcuni giorni dopo il trattamento. Tali sintomi sono localizzati solo sulle foglie interessate dal trattamento; ciò non ha alcun effetto dannoso sulla coltura.

#### AVVERTENZA:

- ♦ Non usare piante trattate come foraggio.
- ♦ Non trattare se la pioggia è prevista entro 6-8 ore.
- ♦ Non trattare in periodi di siccità.
- ♦ In caso di fallimento della coltura, si può riseminare solo la soia.
- ♦ Le colture da radice (carote, rape) si possono impiantare solo dopo 18 mesi dal trattamento con il prodotto.

#### SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

#### ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO: smaltire secondo le norme vigenti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

#### DA NON VENDERSI SFUSO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

Aprile 2003