

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2006 (GU n. 6 del 9-1-2007)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Feudox R», registrato al n. 12200.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 30 aprile 2004 dall'impresa Sariaf Gowan S.p.a. con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Rame Sariaf Blu ora ridenominato Feudox R;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Rame - Dimetomorf;

Vista la nota dell'ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 10 ottobre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'impresa:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina);

Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Sariaf Gowan S.p.a. con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna) e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo - pericoloso per l'ambiente denominato FEUDOX R con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g 50-100-150-250-500-750 e kg 1-5-10-20-25

Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001;

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1971 e 16 aprile 2004;

Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni), autorizzato con decreti del 19 novembre 1998 e 22 settembre 2004.

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12200.

E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio;

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 18-19 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.


ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

FEUDOX R

Fungicida sistemico e di contatto contro peronospora della vite, della patata, del pomodoro e del melone.

Polvere Bagnabile

<p>COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono: Dimetomorf puro g 6 Rame metallo (da Ossicloruro tetramico) g 40 Coformulanti q.b. a g 100</p> <p>SARIAF GOWAN S.p.A. – Via Morgagni, 68 – Faenza (RA) Autorizzazione Ministero della Salute n. del Ufficio di produzione SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT) A.D.I.C.A. S.r.l. – Nera Montoro (Terni)</p> <p>Taglie: gr 50-100-150-250-500-750; kg 1-5-10-20-25. Partita n</p> <p>FRASI DI RISCHIO Nocivo per inalazione. Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.</p> <p>CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].</p>	 <p>PERICOLOSO PER L'AMBIENTE NOCIVO</p>
--	---

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo (da Ossicloruro) e Dimetomorf, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.

Terapia: gastrolisi con soluzione latte-albuminosa, in caso di cupremia elevata usare chelanti, penicillamina, se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAI. intramuscolo, per il resto terapia sintomatica.

Dimetomorf:--

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Fungicida di contatto e citotropico a sistemicità locale che agisce direttamente sul micelio del fungo. Risultano pertanto sensibili tutti gli stadi di sviluppo del fungo dalla germinazione delle zoospore alla formazione degli sporangiofori. Il prodotto possiede un'azione curativa per 2-3 giorni dopo l'inizio dell'infezione.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per ettolitro, distribuiti con pompe a volume normale.

Vite: 350 g/hl (3,5 Kg/ha) contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) intervenire ogni 10-12 giorni a partire dalla prima pioggia infettante. Il prodotto presenta un'azione collaterale contro Marciume acido e Botrite.

Pomodoro, Patata: 300-350 g/hl (3-3,5 Kg/ha) contro Peronospora (*Phitophthora infestans*) intervenire ogni 7-9 giorni, iniziando dal momento in cui si verificano le condizioni ottimali per lo sviluppo della malattia.

Melone: 300-350 g/hl (3-3,5 Kg/ha) contro Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*) intervenire ogni 7-9 giorni, iniziando dal momento in cui si verificano le condizioni ottimali per lo sviluppo della malattia.

FITOTOSSICITÀ: non trattare in fioritura.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con insetticidi ed anticrittogamici.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versarlo nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.


ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

FEUDOX R

Fungicida sistemico e di contatto contro peronospora della vite, della patata, del pomodoro e del melone.

Polvere Bagnabile

<p>COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono: Dimetomorf purog 6 Rame metallo (da Ossicloruro tetraramico)g 40 Coformulanti q.b. ag 100</p> <p>SARIAF GOWAN S.p.A. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)</p> <p>Autorizzazione Ministero della Salute n. del</p> <p>Officina di produzione SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT) A.D.I.C.A. S.r.l. - Nera Montoro (Terni)</p> <p>Taglie: gr 50-100</p> <p>Partita n</p> <p>FRASI DI RISCHIO Nocivo per inalazione. Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.</p> <p>CONSIGLI DI PRUDENZA Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]</p>	 <p>NOCIVO</p>  <p>PERICOLOSO PER L'AMBIENTE</p>
--	--

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo (da Ossicloruro) e Dimetomorf, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione lattalbuminosa, in caso di cupremia elevata usare chelanti, penicillamina, se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica.

Dimetomorf:--

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

06A11874