

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 gennaio 2007 (GU n. 30 del 6-2-2007)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Memory».

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 7 settembre 2006 dall'impresa Sygenta Crop Protection S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MEMORY a uguale al prodotto di riferimento denominato ACTARA 25 WG registrato al n. 11614 con decreto direttoriale in data 21 febbraio 2003 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Actara 25 WG dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato MEMORY è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno

stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Thiamethoxam;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 20 febbraio 2008 l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede in via Gallarate 139 Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato Memory con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g 2-4-10-20-40-50-100-250-400-500.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

STI Solfotecnica Italiana S.p.a. Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997;

Torre S.r.l. Torrenieri Fraz. Montalcino (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003;

Importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera:
- Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13498.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2007

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 29 a pag. 33 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

syngenta

MEMORY®

Insetticida sistemico in granuli idrodispersibili per agrumi, melo, pero, pesco, nettarine, percoche, vite, alcune orticole, floreali, ornamentali e vivai.

Composizione

100 g di prodotto contengono:
thiamethoxam puro g 25
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate 139 - MILANO

Stabilimento di produzione:

Kwizda Agro GmbH, Leubendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n.

g 400

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Altri stabilimenti di produzione:

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista
Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
TORRE S.r.l., Via Plan d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino
- SI)

Altre taglie: g 2,4-10-20-40-50-100-250-500

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo.

Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Memory è un insetticida sistemico, che agisce per contatto e per ingestione. Memory è indicato per controllare un gran numero di insetti ad apparato succhiante ed alcuni ad apparato masticatore. La sostanza attiva, Thiamethoxam, possiede un'elevata attività sistemica, ciò fa sì che l'applicazione possa essere effettuata sia per via fogliare, come per via radicale usando impianti di irrigazione a goccia o trattando direttamente il suolo. La sistemica di Thiamethoxam fa sì che anche i nuovi getti in accrescimento siano protetti dal principio attivo.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:

arancio, limone, clementino, mandarino: **28 giorni;**

vite: **21 giorni**

melo, pero, pesco, nettarine, percoche, tabacco: **14 giorni;**

lattuga, patata: **7 giorni;**

cocomero, cetriolo, melone, peperone, pomodoro, zucchini, melanzana: **3 giorni**

FITOTOSSICITA'

Quando utilizzato alla dose suggerita, Memory è ben tollerato dalle colture. Comunque, nel caso di colture floricole od ornamentali, o varietà ritenute particolarmente sensibili ad applicazioni antiparassitarie, si suggerisce di effettuare sempre dei saggi di selettività prima di applicare il prodotto su grandi superfici.

COMPATIBILITA'

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli insetti acquatici. Adoperare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a metri 10 per l'uso su pomodoro, tabacco, floreali; metri 20 per l'uso su fruttiferi.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.

Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Da non applicare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

segue...

syngenta**Dosi e modalità di impiego:**

Cultura	Fitofagi	Dose: g/ha	Dose: g/ha	Modalità di applicazione
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino	Afidi: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis citricola</i> , <i>Toxoptera aurantii</i>	12	200-300	Una applicazione all'inizio dell'infestazione.
Melo	Afidi: <i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>Aphis pomi</i> Tentredini (<i>Hoplocampa</i> spp.) Afide lanigero: <i>Eriosoma lanigerum</i>			2-3 settimane prima della fioritura o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione Contro le generazioni primaverili-estive
	Psille: <i>Cacopsilla melanoneura</i> <i>Cacopsilla cistalis</i>	30-40	300-450	Contro le neanidi in pre-fioritura Contro le neanidi in post-fioritura.
	Filominatori: <i>Lithocolletis</i> spp., <i>Leucophaea</i> spp.			Intervenire nella fase di schiusura delle uova-comparsa delle prime piccole mine.
Pero	Afidi: <i>Melanaphis pyramis</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Dysaphis</i> spp. Tentredini (<i>Hoplocampa</i> spp.) Psilla: <i>Cacopsylla pyri</i>	30-40	300-450	2-3 settimane pre-fioritura o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione. Contro le neanidi nelle primissime fasi di sviluppo.
Pesco, Nettare, Pereche	Afidi: <i>Myzus persicae</i> , <i>Hyalopteris pruni</i> , <i>Brachycaudus persicae</i> Cicalina verde: <i>Empoasca</i> spp.	15-20 20-30	200-250 200-300	A gemme rigonfie o bottoni rosa addizionato con olio minerale o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione In post-fioritura alla comparsa delle prime forme mobili sui germogli.
Vite	Cicaline: <i>Scapholideus titanus</i> , <i>Empoasca vitis</i> , <i>Metacalla prunosa</i> Afidi: <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	20	200	Intervenire sulle forme giovanili.
Cocomero, Cetriolo, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucchini, Melanzana	Afidi: <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> Aleurodidi: <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> Dorifera: <i>Leptinotarsa decemlineata</i>		400 200	Inizio infestazione. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
Lattuga	Afidi: <i>Nasonovia ribis nigris</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i>		200	Inizio infestazione. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
Patata	Afidi: <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> Dorifera: <i>Leptinotarsa decemlineata</i>		200	Tattare gli afidi ad inizio infestazione e la dorifera alla comparsa dei primi adulti o al raggiungimento della soglia di intervento. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
Tabacco	Afidi: <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> Pulce del tabacco: <i>Epilixia hirtipennis</i>		200	Inizio volo degli afidi Inizio infestazione
Fiorente, Ornamentali, Vivai di arboree ed arbutive	Afidi: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Myzus nicotianae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> Aleurodidi: <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	20 40		Inizio infestazione. Effettuare successive applicazioni se necessario.

SU COCCOMERO, CETRIOLO, MELANZANA, MELONE, PEPERONE, POMODORO, ZUCCHINI, LATTUGA, FIORALI ED ORNAMENTALI, IL TRATTAMENTO SI PUO' EFFETTUARE ANCHE MEDIANTE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE A GOCCIA O TRATTANDO DIRETTAMENTE IL SUOLO CON MEMORY APPENA DOPO LA CRISI DI TRAPIANTO, UTILIZZANDO IN UNICA APPLICAZIONE LA DOSE DI 800 g/ha, OPPURE EFFETTUANDO DUE APPLICAZIONI A DISTANZA SETTIMANALE ALLA DOSE DI 400 g/ha. PER LE COLTURE ARBOREE E POSSIBILE EFFETTUARE UNA SOLA APPLICAZIONE ALL'ANNO.

Su tutte le colture, indipendentemente dal modo di somministrazione di Memory, si consiglia di non superare la quantità applicata complessiva di 800 g per ettaro all'anno. Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi insetticida, si raccomanda di usare Memory secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'utilizzo di altri insetticidi con diverso meccanismo di azione.

Divieto di impiego durante la fioritura, sfalcare le erbe in fioritura presenti sotto le colture al momento del trattamento

syngenta

MEMORY®

Insetticida sistemico in granuli idrodispersibili per agrumi, melo, pero, pesco, nettarine, percoche, vite, alcune orticole, floreali, ornamentali e vivai.

Composizione

100 g di prodotto contengono:
thiamethoxam puro g 25
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate 139 - MILANO

Stabilimento di produzione:
Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n.

g 4

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non
deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato


MEMORY®

Insetticida sistemico in granuli idrodispersibili per agrumi, melo, pero, pesco, nettarine, percoche, vite, alcune orticole, floreali, ornamentali e vivai.

Composizione

100 g di prodotto contengono:
thiamethoxam puro g 25
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate 139 - MILANO

Stabilimento di produzione:

Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)

Registrazione Ministero della Salute n.

del

Partita n.

g 4

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Altri stabilimenti di produzione:

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Collignola (RA)
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Altre taglie: g 2-10-20-40-50

FOGLIO ILLUSTRATIVO
NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo.
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Memory è un insetticida sistemico, che agisce per contatto e per ingestione. Memory è indicato per controllare un gran numero di insetti ad apparato succhiante ed alcuni ad apparato masticatore. La sostanza attiva, Thiamethoxam, possiede un'elevata attività sistemica, ciò fa sì che l'applicazione possa essere effettuata sia per via fogliare, come per via radicale usando impianti di irrigazione a goccia o trattando direttamente il suolo. La sistemica di Thiamethoxam fa sì che anche i nuovi getti in accrescimento siano protetti dal principio attivo.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:

arancio, limone, clementino, mandarino: **28 giorni**;
vite: **21 giorni**
melo, pero, pesco, nettarine, percoche, tabacco: **14 giorni**;
lattuga, patata: **7 giorni**;
cocomero, cetriolo, melone, peperone, pomodoro, zucchini, melanzana: **3 giorni**

FITOTOSSICITA'

Quando utilizzato alla dose suggerita, Memory è ben tollerato dalle colture. Comunque, nel caso di colture floricole od ornamentali, o varietà ritenute particolarmente sensibili ad applicazioni antiparassitarie, si suggerisce di effettuare sempre dei saggi di selettività prima di applicare il prodotto su grandi superfici.

COMPATIBILITA'

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli insetti acquatici. Adoperare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a metri 10 per l'uso su pomodoro, tabacco, floreali; metri 20 per l'uso su fruttiferi.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.

Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smatire le confezioni secondo le norme vigenti

Da non applicare con mezzi aerei

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

segue.

syngenta

Dosi e modalità di impiego:

Dosi e modalità di impiego:				
Cultura	Fitofagi	Dose: g/ha	Dose: g/ha	Modalità di applicazione
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino	Afidi: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis citricola</i> , <i>Toxoptera euranii</i>	12	200-300	Una applicazione all'inizio dell'infestazione.
	Afidi: <i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>Aphis pomi</i> Tentredini (<i>Hoplocampa</i> spp.)			2-3 settimane prima della fioritura o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione
	Afide lanigero: <i>Eriosoma lanigerum</i>			Contro le generazioni primaverili-estive
	Psille: <i>Cacopsilla melanoneura</i> <i>Cacopsilla costalis</i>	30-40	300-450	Contro le neanidi in pre-fioritura. Contro le neanidi in post-fioritura.
Melo	Filoiniatori: <i>Lithocolletis</i> spp., <i>Leucopetra</i> spp.			Intervenire nella fase di chiusura delle uova-comparsa delle prime piccole mine.
Pera	Afidi: <i>Melanaphis pyraeae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Dysaphis</i> spp. Tentredini (<i>Hoplocampa</i> spp.) Psilla: <i>Cacopsylla pyri</i>	30-40	300-450	2-3 settimane pre-fioritura e in post-fioritura all'inizio dell'infestazione. Contro le neanidi nelle primissime fasi di sviluppo.
	Afidi: <i>Myzus persicae</i> , <i>Hyalopteris pruni</i> , <i>Brachycaudus persicae</i> Cicalina verde: <i>Empoasca</i> spp.	15-20 20-30	200-250 200-300	A gemme rigonfie o bottoni rosa addizionato con olio minerale o in post-fioritura all'inizio dell'infestazione In post-fioritura alla comparsa delle prime forme mobili sui germogli.
Vite	Cicaline: <i>Scaphoideus titanus</i> , <i>Empoasca vitis</i> , <i>Melcalpa prunosa</i> Afidi: <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	20	200 200	Intervenire sulle forme giovanili.
Cocomero, Cetriolo, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucchini, Melanzana	Alaurodidi: <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> Dorifora: <i>Leptinotarsa deceptivella</i>		400 200	Inizio infestazione. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
Lattuga	Afidi: <i>Nasanovia ribis-nigri</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Hyperomyzus lactucae</i>		200	Inizio infestazione. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
Patata	Afidi: <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> Dorifora: <i>Leptinotarsa deceptivella</i>		200	Trattare gli afidi ad inizio infestazione e la dorifura alla comparsa dei primi adulti o al raggiungimento della soglia di intervento. Successive applicazioni andranno effettuate a distanza di 1-2 settimane (max 2 applicazioni).
Tabacco	Afidi: <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i> Pulce del tabacco: <i>Eptilimix hirtipennis</i>		200	Inizio volo degli afidi Inizio infestazione
Fioricole, Ornamentali, Vivai di arboree ed arbustive	Afidi: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Myzus nicotianae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> Alaurodidi: <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	20 40		Inizio infestazione. Effettuare successive applicazioni se necessario.

«Su tutte le colture, indipendentemente dal modo di amministrazione di Memory, si consiglia di non superare la quantità applicata complessiva di 800 g per ettaro all'anno. Dato il rischio intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi insetticida, si raccomanda di usare Memory secondo un programma adeguato di prevenzione della resistenza, che comprenda l'utilizzo di altri insetticidi con diverso meccanismo di azione. Obiettivo di impiego durante la fioritura, sfidare le erbe in fioritura presenti sotto le colture al momento del trattamento».

07A01006