



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

## DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su basilico e pomodoro, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario LIMOCIDE reg. n. 17470, contenente la sostanza attiva *Olio essenziale di arancio dolce*.

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

**VISTO** il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del 4 novembre 2019 con il quale è stato registrato al n. 17470 il prodotto fitosanitario denominato LIMOCIDE, contenente la sostanza attiva *Olio essenziale di arancio dolce*, a nome dell’Impresa VIVAGRO S A R L, con sede legale in Technopôle Montesquieu - 5 Allée Jacques Latrille 33650 MARTILLAC France;

**VISTA** la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

**VISTE** le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *Olio essenziale di arancio dolce* per l’utilizzo su basilico contro *peronospora* e su pomodoro in pieno campo e serra contro *peronospora* e *acari*;

**ACQUISITO** il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);

**VISTO** l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego su basilico contro *peronospora* e su pomodoro in pieno campo e serra contro *peronospora* e *acari*, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario LIMOCIDE, contenente la sostanza attiva *Olio essenziale di arancio dolce*;

**SENTITA** la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all’estensione d’impiego su basilico contro *peronospora* e su pomodoro in pieno campo e serra contro *peronospora* e *acari*, del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTA** la nota dell’Ufficio in data 22 marzo 2021 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

**VISTA** la nota del 25 marzo 2021 con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

## DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su basilico contro *peronospora* e su pomodoro in pieno campo e serra contro *peronospora* e *acari* a partire dal 15 maggio 2021 per 120 giorni, del prodotto fitosanitario denominato LIMOCIDE registrato al n. 17470, a nome dell'Impresa VIVAGRO SARL, con sede legale in Technopôle Montesquieu - 5 Allée Jacques Latrille 33650 MARTILLAC France, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it). e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.



Roma, lì 1 aprile 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
\*F.to dott. Massimo CASCIELLO

\* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”

# LIMOCIDE

**Insetticida-Fungicida-Acaricida in liquido solubile(SL)**

COMPOSIZIONE Olioessenziale di arancio dolce g.5,88(=60g/L) Coformulanti q.b.a g.100	  <b>ATTENZIONE</b>
Titolare della registrazione: <b>VIVAGRO S A R L - Technopôle Montesquieu-5 Allée Jacques Latrielle - 33650 MARTILLAC Francia</b> Tel. +33557783268 <b>Registrazione Ministero della Salute n. 17470 del 04.11.2019</b>	
Stabilimenti autorizzati per la produzione: ORO AGRICOLA EUROPE S.A.-Palmela (Portogallo)	
Distributore MANICA: Via all'Adige, 438068 Rovereto (TN) - Italia	
<b>INDICAZIONI DI PERICOLO:</b> <b>H317 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.</b> <b>H319 Provoca grave irritazione oculare. H332 Nocivo se inalato.</b> <b>H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata.</b> <b>CONSIGLI DI PRUDENZA:</b> <b>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261a Evitare di respirare i vapori.</b> <b>P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/ il viso. P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P302+P352 In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.</b> <b>P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.</b> <b>P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alle norme locali /nazionali vigenti.</b> <b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:</b> <b>EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.</b>	
Contenuto: 250-500 mL; 1-5-10-20 L Partitan.	

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici e i pesci, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri dalla zona non coltivata e dai corpi idrici superficiali in caso di trattamenti su fruttiferi, luppole e alberi ornamentali.

Per proteggere gli organismi acquatici e i pesci, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata e dai corpi idrici superficiali per tutte le altre colture.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, rispettare una zona non trattata di 5 metri rispetto all'area non coltivata adiacente, quanto il prodotto viene applicato ad una dose più elevata dei 3 l/ha.

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare durante la fioritura.

**AVVERTENZE PER GLI OPERATORI:** Per le applicazioni in serra in condizioni di scarsa ventilazione indossare maschera facciale e filtro a carboni attivi (A1)

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**  
**Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.**

**MECCANISMO D'AZIONE**

LIMOCIDE è un insetticida-fungicida-acaricida che agisce per contatto con un meccanismo d'azione puramente fisico. Provoca il disseccamento dell'esoscheletro degli insetti e dei corpi molli, durante la fase giovanile e adulta, come ad esempio tripidi, aleurodidi, cicaline e in altre delle membrane cellulari degli organi esterni (micelio, conidi, cleistotecie ecc...) delle patologie fungine.

**PRECAUZIONI E CONSIGLI PER L'IMPIEGO**

Agitare il contenitore prima dell'uso, conservare il prodotto nella sua confezione originale, in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Il contenitore deve rimanere ben chiuso dopo l'impiego, conservando la

chiusura originale. Qualora non si utilizzi interamente il contenuto della confezione di LIMOCIDE, prevederne l'impiego entro 6 mesi dall'apertura. In caso di ingestione consultare un medico. Eliminare la miscela di solo LIMOCIDE eventualmente rimasta in eccesso nella botte irrorando le colture limitrofe più vicine sulle quali il preparato è autorizzato. Risciacquare più volte il contenitore e metterlo all'acquada lavaggio nella miscela di irrorare.

Si consiglia di utilizzare LIMOCIDE su vegetazione asciutta, se ne sconsiglia l'impiego su vegetazione in stress idrico. LIMOCIDE si applica durante tutta la stagione vegetativa quando compaiono le prime infezioni fungine e i primifitofagi. Il meccanismo d'azione garantisce l'assenza di possibili sviluppi di ceppi resistenti e parassiti resistenti al prodotto, di conseguenza può essere utilizzato anche in programmi di lotta integrata a ridurre l'insorgenza di fenomeni di resistenza.

È sconsigliata l'aggiunta di bagnati/adiuvanti a LIMOCIDE, come pure miscele estemporanee di LIMOCIDE con zolfi bagnabili a dosi piene, mentre è possibile sulla vite l'utilizzo di ridotte dosi di zolfi bagnabili (es: 1-2 kg/ha all'80%) e LIMOCIDE.

Su pomacee sono possibili miscele estemporanee di LIMOCIDE con zolfi bagnabili, devono però essere rispettate le indicazioni previste per la vite (massimo 1-2 Kg/ha di zolfo all'80%). Non trattare con questa associazione piante affette da stress biotici, abiotici e con temperature superiori ai 25° C.

In caso di miscele estemporanee con altri agrofarmaci aventi lo stesso target, si consiglia di utilizzare le dosi inferiori riportate in etichetta.

È consigliato l'utilizzo di un agente antischiuma qualora si formi una quantità eccessiva di schiuma nel serbatoio, aspetto fisico correlato al tipo di atomizzatore utilizzato.

**MODALITÀ, DOSI E CAMPI D'IMPIEGO**

Le dosi di seguito riportate si riferiscono ad ettaro. Si riportano inoltre anche il quantitativo di acqua da usare per applicazioni con attrezzature operanti a volume normale (oppure su vite con atomizzatori pneumatici). La dose massima di utilizzo di LIMOCIDE è fissata in relazione al volume massimo di acqua indicata nella tabella di seguito. Qualora si utilizzino volumi di acqua inferiori a quelli indicati, la dose deve essere ridotta di conseguenza.

COLTURA	AVVERSITÀ'	DOSE ETTERARO	DOSI ML/HL E VOLUMI D'ACQUA/HA
VITE	Oidio ( <i>Uncinula necator</i> ) Peronospora con sporulazione in atto ( <i>Plasmopara viticola</i> ), Tripidi ( <i>Drepanothrips reuteri</i> ), Cicaline ( <i>Empoasca vitis</i> , <i>Scaphoideus titanus</i> ecc.)	1,6 l/ha	800 ml/hl (200 l/ha)
	Erinosi ( <i>Colomerus vitis</i> )	2 l/ha	1000 ml/hl (200 l/ha)
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE (in pieno campo e serra)	Aleurodidi ( <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	2 l/ha	400 ml/hl (500 l/ha)
	Tripidi ( <i>Thrips</i> spp. ecc.)	4 l/ha	800 ml/hl (500 l/ha)
POMODORO (*) (in pieno campo e serra)	Acari Peronospora	4 l/ha	800 ml/hl (500 l/ha)
CAROTA (in pieno campo e serra)	Oidio ( <i>Erysiphe heraclei</i> )	2,4 l/ha	600 ml/hl (400 l/ha)
CETRIOLO (in pieno campo e serra)	Oidio ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ), Tripidi ( <i>Thrips</i> spp. ecc.)	8 l/ha	800 ml/hl (1000 l/ha)
	Aleurodidi ( <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ecc)	4 l/ha	400 ml/hl (1000 l/ha)

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

COLTURA	AVVERSITÀ'	DOSEETTAR O	DOSI ML/HL E VOLUMI D'ACQUA/HA
<b>ZUCCHINO, CETRIOLINO</b> (in pienocampoe serra)	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphechichoracearum</i> , <i>Sphaerothecafuliginea</i> )	4 l/ha	800 ml/hl (500 l/ha)
	<b>Aleurodidi</b> ( <i>Bemisiatabaci</i> , <i>Trialeurodesvaporariorumecc</i> )	2 l/ha	400 ml/hl (500 l/ha)
<b>MELONE</b> (in pienocampoe serra)	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphechichoracearum</i> , <i>Sphaerothecafuliginea</i> ), <b>Tripidi</b> ( <i>Thripsspp. Ecc</i> )	8 l/ha	800 ml/hl (1000 l/ha)
	<b>Aleurodidi</b> ( <i>Bemisiatabaci</i> , <i>Trialeurodesvaporariorum</i> )	2 l/ha	400 ml/hl (500 l/ha)
<b>LATTUGA</b> (in pienocampoe serra)	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphechichoracearum</i> ), <b>Peronospora</b> ( <i>Bremialactucaee</i> )	3 l/ha	600 ml/hl (500 l/ha)
	<b>Aleurodidi</b> ( <i>Bemisiatabaci</i> , <i>Trialeurodesvaporariorum</i> )	2 l/ha	400 ml/hl (500 l/ha)
<b>BASILICO (*)</b> (in pieno campo e serra)	<b>Peronospora</b>	3 l/ha	600 ml/hl (500 l/ha)
<b>PORRO</b>	<b>Tripidi</b> ( <i>Thripstabaci</i> )	6,4 l/ha	800 ml/hl (800 l/ha)
<b>CAVOLI</b> (a infiorescenza, a testa, cavolo rapa) (in pieno campo e serra)	<b>Aleurodidi</b> ( <i>Aleyrodesbrassicae</i> , <i>Aleyrodesproletella, ecc.</i> )	2 l/ha	400 ml/hl (500 l/ha)
	<b>Tripidi</b> ( <i>Thripsspp. ecc.</i> )	4 l/ha	800 ml/hl (500 l/ha)
<b>CAVOLI a foglia</b>	<b>Ruggine bianca</b> ( <i>Albugo candida</i> )	2 l/ha	500 ml/hl (400 l/ha)
<b>LEGUMINOSE da GRANELLA</b> (Fagiolo, Pisello, Cece, Lenticchia, Fava)	<b>Tripidi</b> ( <i>Thripsspp. ecc.</i> )	4 l/ha	800 ml/hl (500 l/ha)
<b>CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO</b>	<b>Tripidi</b> ( <i>Thripstabaci ecc.</i> )	3,2 l/ha	800 ml/hl (400 l/ha)
<b>VALERIANELLA, PREZZEMOLO</b> (in pieno campo e serra)	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphesp.</i> )	1,8 l/ha	600 ml/hl (300 l/ha)
<b>SCAROLA RICCIA</b> (in pieno campo e serra)	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphechichoracearum</i> )	3 l/ha	600 ml/hl (500 l/ha)
<b>SCORZONERA e BARBA DI BECCO</b>	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphesp.</i> )	3 l/ha	600 ml/hl (500 l/ha)
<b>RAVANELLO</b>	<b>Peronospora</b> ( <i>Peronospora parasiticae</i> )	3,2 l/ha	400 ml/hl (800 l/ha)
<b>TABACCO</b>	<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphesp.</i> ), <b>Peronospora</b> ( <i>Peronospora tabacina</i> )	3l/ha	600 ml/hl (500 l/ha)
	<b>Aleurodidi</b> ( <i>Bemisiatabaci</i> )	2 l/ha	400 ml/hl (500 l/ha)
	<b>Tripidi</b> ( <i>Thripstabaci</i> )	3,2 l/ha	800 ml/hl (400 l/ha)

COLTURA	AVVERSITÀ'	DOSEETTAR O	DOSI ML/HL E VOLUMI D'ACQUA/HA
<b>RIBES, LAMPONE, MORA, UVA SPINA</b>	<b>Oidio</b> ( <i>Sphaerotheca s</i> <i>pp.</i> ), <b>Cicaline</b> ( <i>Metcalfa pruinosa</i> ), <b>Psilla e</b> <b>Cercopidi</b>	2,4 l/ha	800 ml/hl (300 l/ha)
	<b>Ragnetto rosso</b> ( <i>Tetranychusurticae</i> ) <b>ecc</b> <b>ed Eriofidi</b>	2 l/ha	1000 ml/hl (200 l/ha)
<b>FRAGOLA</b>	<b>Oidio</b> ( <i>Sphaerothecaspp.</i> )	3 l/ha	600 ml/hl (500 l/ha)
	<b>Tripidi</b> ( <i>Frankliniellaoccidentalis ecc.</i> )	4 l/ha	800 ml/hl (500 l/ha)
<b>MELO, PERO, COTOGNO</b>	<b>Psille del melo</b> ( <i>Cacopsylla mali</i> ), <b>Cicaline, Cercopidi</b>	4 l/ha	800 ml/hl (500 l/ha)
	<b>Psilla del pero</b> ( <i>Psyllapyriecc.</i> ), <b>Oidio</b> ( <i>Podosphaeraleucotricha</i> )	2,8 l/ha	400 ml/hl (700 l/ha)
<b>MELO, PERO</b>	<b>Ticchiolatura</b> ( <i>Venturiaspp</i> )	4 l/ha	400 ml/hl (1000 l/ha)
<b>PESCO</b>	<b>Oidio</b> ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	6 l/ha	600 ml/hl (1000 l/ha)
<b>ACTINIDIA</b>	<b>Cicaline</b> ( <i>Empoascaspp.</i> , <i>Metcalfa</i> <i>pruinosa</i> ), <b>Cercopidi</b> ( <i>Cercopisspp.</i> )	8 l/ha	800 ml/hl (1000 l/ha)
<b>AGRUMI</b> (arancio, limone, pompelmo, mandarino, clementino, cedro, bergamotto, chinotto, kumquat, limetta, lime)	<b>Cicaline</b> ( <i>Empoascaspp.</i> , ecc.), <b>Cercopidi</b> ( <i>Cercopisspp.</i> ), <b>Psilla</b> ( <i>Psyllacitrus</i> ), <b>Cocciniglie</b> ( <i>Aonidiella auranti</i> <i>ecc.</i> ), <b>Aleurodidi</b> ( <i>Aleurocantuspinferus</i> ), <b>Tripidi</b> ( <i>Heliothripsspp.</i> )	8 l/ha	800 ml/hl (1000 l/ha)
	<b>Acari</b> ( <i>Panonychuscitri</i> , <i>Tetranychusurticae</i> )	6 l/ha	600 ml/hl (1000 l/ha)
<b>ANANAS</b>	<b>Cocciniglie</b> ( <i>Diaspisbromelia ecc.</i> )	8 l/ha	800 ml/hl (1000 l/ha)
<b>AVOCADO</b>	<b>Cocciniglie, Aleurododi, Tripidi</b>	0,8 l/ha	800 ml/hl (100 l/ha)
	<b>Tigre</b> ( <i>Pseudacystaperseae</i> )	1 l/ha	1000 ml/hl (100 l/ha)
<b>BANANO</b>	<b>Aleurodidi, Cocciniglie, Tripidi</b>	2 l/ha	800 ml/hl (250 l/ha)
<b>FRUTTO della PASSIONE</b>	<b>Acari, Cocciniglie, Tripidi</b>	8 l/ha	800 ml/hl (1000 l/ha)
<b>GUAIAVE</b>	<b>Aleurodidi</b>	8 l/ha	800 ml/hl (1000 l/ha)
<b>MANGO</b>	<b>Aleurodidi, Cocciniglie, Oidio, Tripidi</b>	8 l/ha	800 ml/hl (1000 l/ha)
<b>PALME alimentari</b>	<b>Aleurodidi</b>	8 l/ha	800 ml/hl (1000 l/ha)
<b>PAPAYA</b>	<b>Acari, Cocciniglie, Oidio</b>	8 l/ha	800 ml/hl (1000 l/ha)
<b>LUPPOLO</b>	<b>Oidio</b>	6 l/ha	600 ml/hl (1000 l/ha)
<b>PIANTE OFFICINALI da INFUSIONE</b>	<b>Malattie fungine</b>	3 l/ha	600 ml/hl

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

COLTURA	AVVERSITÀ'	DOSEETTAR O	DOSI ML/HL E VOLUMI D'ACQUA/HA
CRISANTEMO	Ruggine bianca ( <i>Puccinia oriana</i> )	10 l/ha	1000 ml/hl (1000 l/ha)
FLOREALI ED ORNAMENTALI	Oidio	6 l/ha	600 ml/hl (1000 l/ha)
	Tripidi	6.4 l/ha	800 ml/hl (800 l/ha)
	Aleurodidi	4 l/ha	400 ml/hl (1000 l/ha)
ROSA	Oidio ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	6 l/ha	600 ml/hl (1000 l/ha)
	Aleurodidi ( <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	4 l/ha	400 ml/hl (1000 l/ha)
	Tripidi	8 l/ha	800 ml/hl (1000 l/ha)
Alberied arbustiornamentali	Oidio ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	6 l/ha	600 ml/hl (1000 l/ha)
	Tripidi ( <i>Thrips spp.</i> )	6,4 l/ha	800 ml/hl (800 l/ha)
	Cicaline, Psille, Cimici	8 l/ha	800 ml/l (1000 l/ha)
GENZIANA, DRAGONCELLO	Oidio ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	3 l/ha	600 ml/hl (500 l/ha)

(\* *Usa su BASILICO contro peronospora autorizzato dal 15 maggio 2021 all'11 settembre 2021*

(\* *Usa su POMODORO contro Acari e Peronospora autorizzato dal 15 maggio 2021 all'11 settembre 2021*

Effettuare al massimo il seguente numero di applicazioni per ciclo colturale:

**2 trattamenti per Ribes e Lamponi su Ragnetto rosso e Eriofidi, per Vite su Erinosi**

**3 trattamenti per Actinidia, Agrumi, Cetriolo, Melone, Zucchine su Aleurodidi, per Crisantemo su Ruggine;**

**4 trattamenti per Pesco, Porro, Rosa ed altre colture floreali ed ornamentali;**

**6 applicazioni su tutte le altre colture**

In caso di attacchi medi o forti, LIMOCIDE deve essere utilizzato ai dosaggi più contenuti in associazione estemporanea con fungicidi o insetticidi specifici contro le avversità da combattere. In caso di attacchi deboli distanziare i trattamenti di 7/8 giorni.

Su **pomacee** non applicare LIMOCIDE a concentrazioni superiori a **400 ml/hl**, indipendentemente dai volumi di acqua distribuiti. Evitare eccessive bagnature (es. gocciolamento) e/o accumuli di miscela irrorante su foglie e frutti.

Nelle colture in serra, si consiglia di ridurre di **100-200 ml/hl** (0,1%-0,2%) la concentrazione di LIMOCIDE rispetto alle dosi sopra indicate. In caso di una infestazione contemporanea di oidio e aleurodidi (mosche bianche), una singola applicazione avrà effetto su entrambe le avversità, utilizzando il dosaggio più elevato.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** sospendere i trattamenti **3 giorni prima della raccolta su tutte le colture**

**COMPATIBILITÀ':** nelle applicazioni sperimentali e di campo non sono emerse incompatibilità con altre molecole.

**Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ':** LIMOCIDE non ha presentato fenomeni di fitotossicità alle dosi e alle prescrizioni indicate in etichetta. In considerazione della continua introduzione di nuove varietà orticole e frutticole, si consiglia di valutare la selettività di LIMOCIDE su piccole superfici prima di procedere con il trattamento.

**ATTENZIONE**

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso voi non l'avete riportato. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

LIMOCIDE: Marchio registrato VIVAGRO